

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐性リスク
FOLFILI±BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	初回1時間30分 2回目1時間 3回目以降30分	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分			
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間			
	フルオロウラシル	400mg/m ² 2400mg/m ²	全開 46時間			
mFOLFOX6±BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	初回1時間30分 2回目1時間 3回目以降30分	Day1	14日	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間			
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間			
	フルオロウラシル	400mg/m ² 2400mg/m ²	全開 46時間			
SOX±BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	初回1時間30分 2回目1時間 3回目以降30分	Day1	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	Day1-14		
	テガフルール オテラシル ギメラシル	80mg/m ²	内服			
CAPOX±BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	初回1時間30分 2回目1時間 3回目以降30分	Day1	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	Day1-14		
	カペシタビン	2000mg/m ² /分2	内服			
FOLFILI±PANI	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分			
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間			
	フルオロウラシル	400mg/m ² 2400mg/m ²	全開 46時間			
mFOLFOX6±PANI	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	Day1	14日	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間			
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間			
	フルオロウラシル	400mg/m ² 2400mg/m ²	全開 46時間			
IRIS±BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	初回1時間30分 2回目1時間 3回目以降30分	Day1	21日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	1時間30分	Day1		
	テガフルール オテラシル ギメラシル	80mg/m ²	内服	Day1-14		